



DR. MED. LUCIAN STROIE  
FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe

Termine nach telefonischer Vereinbarung:



Dr. Lucian Stroie  
Schulhausstrasse 4  
8600 Dübendorf

Telefon: +41 (0) 44 821 70 80  
E-Mail: [praxis-stroie@hin.ch](mailto:praxis-stroie@hin.ch)



*"Ein Wunsch ändert nichts.  
Eine Entscheidung ändert alles."*

Nora Ephron

 **DR. LUCIAN STROIE**  
FACHARZT FÜR GYNÄKOLOGIE + GEBURTSHILFE



*Women's Health*

**NICHT-INVASIVE  
GYNÄKOLOGISCHE LASER-THERAPIEN**  
innovativ | schmerzlos | ohne Ausfallzeit

## Nach einer Geburt...



...und nach der Abänderung kann es aufgrund von Östrogenmangel zu Scheidentrockenheit, dünner, rissiger Haut, Jucken und Brennen kommen.

Viele Patientinnen sind aber geburtsbedingt von einer leichten Harninkontinenz oder einer Erschlaffung der Scheidenwände betroffen.

Eine Blaseninkontinenz, speziell wenn der Urinverlust beim Husten, Lachen oder Springen auftritt, kann die Lebensqualität deutlich reduzieren.

Die Haut verliert die natürliche Elastizität und Spannkraft und schlussendlich kann das Sexualleben darunter auch leiden.

Durch die **vaginale Laserbehandlung** wird die Haut wieder kräftiger und elastischer.

Dank dem Vaginal-Laser können verschiedene gynäkologische Beschwerden nicht-invasiv, schmerzlos und medikamentenfrei behandelt werden.




## Wann ist eine Lasertherapie empfohlen?

- Scheidentrockenheit in der Menopause
- Bei Therapie von Brustkrebs
- Nach der Geburt
- Urininkontinenz (Urinverlust bei körperlicher Anstrengung)
- Senkungsbeschwerden im Intimbereich
- Scheidenstraffung

## Wie funktioniert der Laser?

Durch die Erwärmung des Gewebes kommt es zu einer Erneuerung der Haut und eine Neubildung von straffenden Fasern im Gewebe. Das spezielle an diesem Laser ist, dass es keine Verletzung oder Schädigung gibt und die Behandlung kann ohne Anästhesie durchgeführt werden.

Es handelt sich um eine schonende und sehr effiziente Behandlung.



## Wie geht die Behandlung?

Die Behandlung findet ambulant statt und dauert 15-30 Minuten.

Bei einer erstmaligen Therapie sind 3 Sitzungen im Abstand von 4-5 Wochen empfohlen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.